



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	360	202	157	153
ロイシン	1.5%	609	370	281	244
リジン	1.5%	622	185	145	261
メチオニン	0.5%	211	185	137	
シスチン	0.3%	117			
メチオニン・シスチン計	0.8%	330	353	269	178
フェニルアラニン	0.9%	366	252	186	
チロシン	0.7%	281			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	647	404	306	302
スレオニン	0.9%	367	235	178	199
トリプトファン	0.3%	106	77	58	66
バリン	1.1%	439	269	203	161
ヒスチジン	0.8%	336	104	79	74
アルギニン	1.2%	513	185	145	211

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	360	267	250	180
ロイシン	609	452	440	410	103	110
リジン	622	461	340	360	136	128
メチオニン・シスチン計	330	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	647	480	380	390	126	123
スレオニン	367	272	250	210	109	130
トリプトファン	106	79	60	70	131	113
バリン	439	325	310	220	105	148
ヒスチジン	336	250	-	120	-	208
全窒素量(g)	1.3					

