

[illegible]

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	150	202	71	69
ロイシン	1.4%	258	370	127	111
リジン	1.4%	271	185	66	118
メチオニン	0.5%	85	185	62	
シスチン	0.3%	48			
メチオニン・シスチン計	0.7%	133	353	122	81
フェニルアラニン	0.8%	147	252	84	
チロシン	0.6%	114			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	261	404	139	137
スレオニン	0.8%	151	235	81	90
トリプトファン	0.2%	43	77	26	30
バリン	1.0%	182	269	92	73
ヒスチジン	0.5%	92	104	36	34
アルギニン	1.1%	207	185	66	96

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	150	279	250	180	112	155
ロイシン	258	479	440	410	109	117
リジン	271	503	340	360	148	140
メチオニン・シスチン計	133	247	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	261	485	380	390	128	124
スレオニン	151	280	250	210	112	133
トリプトファン	43	79	60	70	132	113
バリン	182	338	310	220	109	154
ヒスチジン	92	171	-	120	-	143
全窒素量(g)	0.5					

