アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	339	202	148	144
ロイシン	1.5%	576	370	265	230
リジン	1.5%	588	185	136	246
メチオニン	0.5%	182	185	129	
シスチン	0.3%	109			
メチオニン・シスチン計	0.7%	290	353	253	168
フェニルアラニン	0.9%	336	252	175	
チロシン	0.7%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	591	404	288	284
スレオニン	0.8%	330	235	168	187
トリプトファン	0.2%	96	77	55	62
バリン	1.0%	403	269	191	152
ヒスチジン	0.5%	206	104	74	70
アルギニン	1.2%	469	185	136	199

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	339	280	250	180
ロイシン	576	476	440	410	108	116
リジン	588	487	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	290	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	591	489	380	390	129	125
スレオニン	330	273	250	210	109	130
トリプトファン	96	79	60	70	132	113
バリン	403	334	310	220	108	152
ヒスチジン	206	170	-	120	-	142
全窒素量(g)	1.2