

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	340	202	143	139
ロイシン	1.5%	577	370	256	222
リジン	1.6%	596	185	132	237
メチオニン	0.5%	178	185	124	
シスチン	0.3%	107			
メチオニン・シスチン計	0.8%	285	353	245	162
フェニルアラニン	0.9%	337	252	170	
チロシン	0.7%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	592	404	279	275
スレオニン	0.9%	330	235	162	181
トリプトファン	0.3%	95	77	53	60
バリン	1.1%	403	269	185	147
ヒスチジン	0.5%	206	104	72	68
アルギニン	1.2%	454	185	132	192

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	340	281	250	180	112	156
ロイシン	577	476	440	410	108	116
リジン	596	492	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	285	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	592	489	380	390	129	125
スレオニン	330	273	250	210	109	130
トリプトファン	95	78	60	70	131	112
バリン	403	333	310	220	107	151
ヒスチジン	206	170	-	120	-	142
全窒素量(g)	1.2					

