

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	334	202	142	138
ロイシン	1.5%	564	370	254	220
リジン	1.6%	583	185	131	235
メチオニン	0.5%	175	185	123	
シスチン	0.3%	105			
メチオニン・シスチン計	0.7%	280	353	243	161
フェニルアラニン	0.9%	329	252	168	
チロシン	0.7%	249			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	578	404	277	273
スレオニン	0.9%	322	235	161	179
トリプトファン	0.2%	92	77	52	60
バリン	1.1%	393	269	183	146
ヒスチジン	0.5%	201	104	71	67
アルギニン	1.2%	444	185	131	191

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	334	278	250	180	111	154
ロイシン	564	469	440	410	107	114
リジン	583	485	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	280	233	220	160	106	145
フェニルアラニン・チロシン計	578	481	380	390	127	123
スレオニン	322	268	250	210	107	128
トリプトファン	92	77	60	70	128	110
バリン	393	327	310	220	106	149
ヒスチジン	201	168	-	120	-	140
全窒素量(g)	1.2					

