



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	341	202	148	144
ロイシン	1.5%	579	370	265	230
リジン	1.5%	591	185	136	245
メチオニン	0.5%	183	185	128	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.7%	292	353	253	167
フェニルアラニン	0.9%	339	252	175	
チロシン	0.7%	256			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	595	404	288	284
スレオニン	0.9%	332	235	167	187
トリプトファン	0.2%	96	77	54	62
バリン	1.0%	405	269	191	152
ヒスチジン	0.5%	207	104	74	70
アルギニン	1.2%	472	185	136	198

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	341	279	250	180
ロイシン	579	475	440	410	108	116
リジン	591	485	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	292	239	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	595	488	380	390	128	125
スレオニン	332	273	250	210	109	130
トリプトファン	96	79	60	70	132	113
バリン	405	333	310	220	107	151
ヒスチジン	207	170	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.2					

