

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	282	202	96	94
ロイシン	1.8%	469	370	172	150
リジン	1.9%	488	185	89	160
メチオニン	0.6%	146	185	84	
シスチン	0.3%	82			
メチオニン・シスチン計	0.9%	226	353	165	109
フェニルアラニン	1.0%	261	252	114	
チロシン	0.8%	203			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	465	404	188	185
スレオニン	1.1%	270	235	109	122
トリプトファン	0.3%	77	77	36	41
バリン	1.2%	312	269	124	99
ヒスチジン	1.0%	261	104	48	46
アルギニン	1.5%	384	185	89	129

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	282	294	250	180	118	164
ロイシン	469	490	440	410	111	119
リジン	488	510	340	360	150	142
メチオニン・シスチン計	226	236	220	160	107	148
フェニルアラニン・チロシン計	465	485	380	390	128	124
スレオニン	270	282	250	210	113	134
トリプトファン	77	80	60	70	134	114
バリン	312	326	310	220	105	148
ヒスチジン	261	272	-	120	-	227
全窒素量(g)	1.0					

