

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	299	202	139	135
ロイシン	1.4%	519	370	248	216
リジン	1.4%	524	185	128	230
メチオニン	0.4%	157	185	121	
シスチン	0.3%	98			
メチオニン・シスチン計	0.7%	255	353	237	157
フェニルアラニン	0.8%	307	252	164	
チロシン	0.6%	235			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	542	404	270	267
スレオニン	0.8%	294	235	157	175
トリプトファン	0.2%	85	77	51	58
バリン	1.0%	357	269	179	142
ヒスチジン	0.5%	192	104	69	66
アルギニン	1.2%	428	185	128	186

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	299	476	250	180	190	264
ロイシン	519	826	440	410	188	201
リジン	524	834	340	360	245	232
メチオニン・シスチン計	255	405	220	160	184	253
フェニルアラニン・チロシン計	542	862	380	390	227	221
スレオニン	294	468	250	210	187	223
トリプトファン	85	136	60	70	227	194
バリン	357	569	310	220	183	258
ヒスチジン	192	306	-	120	-	255
全窒素量(g)	0.6					

