

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	401	202	155	151
ロイシン	1.6%	655	370	278	241
リジン	1.7%	690	185	143	258
メチオニン	0.5%	215	185	135	
シスチン	0.3%	117			
メチオニン・シスチン計	0.8%	333	353	266	176
フェニルアラニン	0.9%	388	252	184	
チロシン	0.7%	297			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	685	404	303	299
スレオニン	0.9%	377	235	176	196
トリプトファン	0.3%	112	77	57	65
バリン	1.1%	461	269	201	160
ヒスチジン	1.2%	480	104	78	74
アルギニン	1.2%	495	185	143	209

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	401	287	250	180	115	159
ロイシン	655	469	440	410	107	114
リジン	690	494	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	333	239	220	160	108	149
フェニルアラニン・チロシン計	685	491	380	390	129	126
スレオニン	377	270	250	210	108	128
トリプトファン	112	80	60	70	133	114
バリン	461	330	310	220	106	150
ヒスチジン	480	343	-	120	-	286
全窒素量(g)	1.4					

