



アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	352	202	146
ロイシン	1.5%	580	370	262
リジン	1.6%	602	185	135
メチオニン	0.5%	200	185	127
シスチン	0.3%	108		
メチオニン・シスチン計	0.8%	310	353	250
フェニルアラニン	0.9%	344	252	173
チロシン	0.7%	264		
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	608	404	285
スレオニン	0.9%	338	235	165
トリプトファン	0.3%	101	77	54
バリン	1.1%	412	269	189
ヒスチジン	1.1%	427	104	73
アルギニン	1.2%	465	185	135

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	352	283	250	180
ロイシン	580	466	440	410	106	114
リジン	602	484	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	310	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	608	489	380	390	129	125
スレオニン	338	272	250	210	109	129
トリプトファン	101	81	60	70	136	116
バリン	412	331	310	220	107	151
ヒスチジン	427	344	-	120	-	286
全窒素量(g)	1.2					

