

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	376	202	148	144
ロイシン	1.7%	645	370	265	230
リジン	1.7%	651	185	137	246
メチオニン	0.5%	211	185	129	
シスチン	0.3%	121			
メチオニン・シスチン計	0.9%	334	353	254	168
フェニルアラニン	1.0%	384	252	176	
チロシン	0.8%	295			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	679	404	289	285
スレオニン	1.0%	373	235	168	187
トリプトファン	0.3%	109	77	55	62
バリン	1.1%	441	269	191	152
ヒスチジン	0.8%	296	104	74	70
アルギニン	1.4%	536	185	137	199

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	376	274	250	180
ロイシン	645	471	440	410	107	115
リジン	651	475	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	334	243	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	679	495	380	390	130	127
スレオニン	373	272	250	210	109	130
トリプトファン	109	80	60	70	133	114
バリン	441	322	310	220	104	146
ヒスチジン	296	216	-	120	-	180
全窒素量(g)	1.4					

