



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	350	202	156	152
ロイシン	1.5%	596	370	279	242
リジン	1.4%	589	185	143	258
メチオニン	0.5%	204	185	135	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	0.8%	322	353	266	176
フェニルアラニン	0.9%	360	252	184	
チロシン	0.7%	276			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	637	404	303	299
スレオニン	0.9%	354	235	176	197
トリプトファン	0.3%	105	77	57	66
バリン	1.0%	428	269	201	160
ヒスチジン	0.8%	317	104	78	74
アルギニン	1.3%	515	185	143	209

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	350	272	250	180
ロイシン	596	462	440	410	105	113
リジン	589	457	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	322	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	637	494	380	390	130	127
スレオニン	354	275	250	210	110	131
トリプトファン	105	82	60	70	136	117
バリン	428	332	310	220	107	151
ヒスチジン	317	246	-	120	-	205
全窒素量(g)	1.3					

