

アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	322	202	141
ロイシン	1.5%	546	370	253
リジン	1.5%	573	185	130
メチオニン	0.5%	167	185	123
シスチン	0.3%	97		
メチオニン・シスチン計	0.7%	264	353	242
フェニルアラニン	0.9%	316	252	167
チロシン	0.6%	238		
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	555	404	275
スレオニン	0.8%	315	235	160
トリプトファン	0.2%	88	77	52
バリン	1.0%	381	269	182
ヒスチジン	0.5%	193	104	71
アルギニン	1.1%	411	185	130

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	322	286	250	180
ロイシン	546	485	440	410	110	118
リジン	573	510	340	360	150	142
メチオニン・シスチン計	264	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	555	493	380	390	130	126
スレオニン	315	280	250	210	112	133
トリプトファン	88	78	60	70	130	112
バリン	381	339	310	220	109	154
ヒスチジン	193	171	-	120	-	143
全窒素量(g)	1.1					

