

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	アミノ酸
イソロイシン	1.0%	353	202	141	138
ロイシン	1.6%	590	370	253	219
リジン	1.7%	614	185	130	234
メチオニン	0.5%	193	185	123	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.8%	304	353	242	160
フェニルアラニン	0.9%	351	252	167	
チロシン	0.7%	266			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	618	404	275	271
スレオニン	0.9%	345	235	160	178
トリプトファン	0.3%	100	77	52	59
バリン	1.1%	414	269	182	145
ヒスチジン	0.6%	241	104	71	67
アルギニン	1.3%	498	185	130	190

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	353	284	250	180
ロイシン	590	474	440	410	108	116
リジン	614	493	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	304	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	618	496	380	390	131	127
スレオニン	345	277	250	210	111	132
トリプトファン	100	80	60	70	134	115
バリン	414	333	310	220	107	151
ヒスチジン	241	194	-	120	-	162
全窒素量(g)	1.2					

