



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	353	202	151	147
ロイシン	1.5%	601	370	270	234
リジン	1.5%	610	185	139	250
メチオニン	0.5%	192	185	131	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.8%	306	353	258	170
フェニルアラニン	0.9%	353	252	178	
チロシン	0.7%	266			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	619	404	293	289
スレオニン	0.9%	345	235	170	190
トリプトファン	0.3%	101	77	55	63
バリン	1.1%	422	269	194	155
ヒスチジン	0.5%	216	104	75	71
アルギニン	1.3%	502	185	139	202

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	353	277	250	180
ロイシン	601	472	440	410	107	115
リジン	610	478	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	306	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	619	485	380	390	128	124
スレオニン	345	271	250	210	108	129
トリプトファン	101	79	60	70	132	113
バリン	422	331	310	220	107	150
ヒスチジン	216	169	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.3					

