

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	346	202	142	138
ロイシン	1.5%	567	370	253	220
リジン	1.6%	603	185	130	235
メチオニン	0.5%	190	185	123	
シスチン	0.3%	102			
メチオニン・シスチン計	0.8%	293	353	242	160
フェニルアラニン	0.9%	337	252	168	
チロシン	0.7%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	592	404	276	272
スレオニン	0.9%	332	235	160	179
トリプトファン	0.3%	98	77	52	60
バリン	1.1%	403	269	183	145
ヒスチジン	1.1%	422	104	71	67
アルギニン	1.2%	430	185	130	190

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	346	284	250	180
ロイシン	567	465	440	410	106	113
リジン	603	495	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	293	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	592	485	380	390	128	124
スレオニン	332	272	250	210	109	129
トリプトファン	98	80	60	70	134	115
バリン	403	331	310	220	107	150
ヒスチジン	422	346	-	120	-	289
全窒素量(g)	1.2					

