

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	354	202	136	133
ロイシン	1.6%	585	370	244	211
リジン	1.7%	614	185	125	226
メチオニン	0.5%	182	185	118	
シスチン	0.3%	106			
メチオニン・シスチン計	0.8%	288	353	233	154
フェニルアラニン	1.0%	343	252	161	
チロシン	0.7%	260			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	603	404	265	262
スレオニン	0.9%	339	235	154	172
トリプトファン	0.3%	101	77	50	57
バリン	1.1%	407	269	176	140
ヒスチジン	1.0%	371	104	68	65
アルギニン	1.3%	456	185	125	183

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	354	285	250	180
ロイシン	585	470	440	410	107	115
リジン	614	493	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	288	232	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	603	484	380	390	127	124
スレオニン	339	272	250	210	109	130
トリプトファン	101	81	60	70	135	115
バリン	407	327	310	220	105	148
ヒスチジン	371	298	-	120	-	248
全窒素量(g)	1.2					

