

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
		NRC		AAFCO	
/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	アミノ酸
イソロイシン	1.0%	337	202	129	126
ロイシン	1.7%	565	370	232	201
リジン	1.8%	597	185	119	215
メチオニン	0.5%	183	185	112	
シスチン	0.3%	102			
メチオニン・シスチン計	0.8%	287	353	221	146
フェニルアラニン	1.0%	333	252	153	
チロシン	0.7%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	588	404	252	249
スレオニン	1.0%	327	235	146	163
トリプトファン	0.3%	93	77	48	54
バリン	1.1%	386	269	167	133
ヒスチジン	0.8%	267	104	65	61
アルギニン	1.3%	433	185	119	174

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
イソロイシン	337	262	250	180	105	146
ロイシン	565	440	440	410	100	107
リジン	597	464	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	287	223	220	160	101	139
フェニルアラニン・チロシン計	588	458	380	390	120	117
スレオニン	327	254	250	210	102	121
トリプトファン	93	73	60	70	121	104
バリン	386	300	310	220	97	136
ヒスチジン	267	208	-	120	-	173
全窒素量(g)	1.3					

