

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
	/DM	mg			
イソロイシン	1.0%	353	202	138	134
ロイシン	1.7%	606	370	246	214
リジン	1.8%	649	185	127	228
メチオニン	0.5%	198	185	120	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	0.8%	303	353	235	156
フェニルアラニン	1.0%	350	252	163	
チロシン	0.8%	274			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	624	404	268	264
スレオニン	1.0%	356	235	156	174
トリプトファン	0.3%	99	77	51	58
バリン	1.1%	416	269	178	141
ヒスチジン	0.8%	284	104	69	65
アルギニン	1.2%	447	185	127	185

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
	（mg）					
イソロイシン	353	275	250	180	110	153
ロイシン	606	473	440	410	107	115
リジン	649	507	340	360	149	141
メチオニン・シスチン計	303	237	220	160	108	148
フェニルアラニン・チロシン計	624	487	380	390	128	125
スレオニン	356	278	250	210	111	132
トリプトファン	99	78	60	70	129	111
バリン	416	324	310	220	105	147
ヒスチジン	284	222	—	120	—	185
全窒素量(g)	1.3					

