

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	アミノ酸
イソロイシン	1.0%	342	202	125	122
ロイシン	1.8%	590	370	223	194
リジン	1.9%	638	185	115	207
メチオニン	0.6%	195	185	108	
シスチン	0.3%	99			
メチオニン・シスチン計	0.9%	296	353	214	141
フェニルアラニン	1.0%	338	252	148	
チロシン	0.8%	266			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	604	404	243	240
スレオニン	1.1%	347	235	141	158
トリプトファン	0.3%	95	77	46	53
バリン	1.2%	402	269	161	128
ヒスチジン	0.8%	279	104	62	59
アルギニン	1.3%	432	185	115	168

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	342	279	250	180
ロイシン	590	481	440	410	109	117
リジン	638	520	340	360	153	145
メチオニン・シスチン計	296	241	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	604	493	380	390	130	126
スレオニン	347	284	250	210	113	135
トリプトファン	95	77	60	70	129	111
バリン	402	328	310	220	106	149
ヒスチジン	279	227	-	120	-	190
全窒素量(g)	1.2					

