

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	356	202	144	140
ロイシン	1.5%	583	370	258	224
リジン	1.6%	626	185	133	239
メチオニン	0.5%	199	185	125	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	0.8%	304	353	247	163
フェニルアラニン	0.9%	344	252	171	
チロシン	0.7%	260			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	604	404	281	277
スレオニン	0.9%	346	235	163	182
トリプトファン	0.3%	100	77	53	61
バリン	1.1%	417	269	186	148
ヒスチジン	1.2%	444	104	72	68
アルギニン	1.2%	437	185	133	193

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	356	280	250	180
ロイシン	583	459	440	410	104	112
リジン	626	492	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	304	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	604	476	380	390	125	122
スレオニン	346	272	250	210	109	130
トリプトファン	100	79	60	70	132	113
バリン	417	329	310	220	106	149
ヒスチジン	444	349	-	120	-	291
全窒素量(g)	1.3					

