



アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	393	202	151	147
ロイシン	1.6%	642	370	271	235
リジン	1.7%	687	185	139	251
メチオニン	0.6%	223	185	131	
シスチン	0.3%	121			
メチオニン・シスチン計	0.9%	346	353	259	171
フェニルアラニン	1.0%	379	252	179	
チロシン	0.7%	288			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	667	404	294	290
スレオニン	1.0%	378	235	171	191
トリプトファン	0.3%	114	77	56	64
バリン	1.2%	467	269	195	155
ヒスチジン	1.2%	486	104	76	72
アルギニン	1.3%	507	185	139	203

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	393	273	250	180
ロイシン	642	446	440	410	101	109
リジン	687	477	340	360	140	133
メチオニン・シスチン計	346	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	667	464	380	390	122	119
スレオニン	378	263	250	210	105	125
トリプトファン	114	80	60	70	133	114
バリン	467	324	310	220	105	147
ヒスチジン	486	338	-	120	-	281
全窒素量(g)	1.4					

