



アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	349	202	140
ロイシン	1.7%	608	370	250
リジン	1.7%	611	185	129
メチオニン	0.5%	190	185	121
シスチン	0.3%	117		
メチオニン・シスチン計	0.8%	306	353	239
フェニルアラニン	1.0%	354	252	166
チロシン	0.7%	272		
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	626	404	272
スレオニン	0.9%	345	235	158
トリプトファン	0.3%	105	77	52
バリン	1.1%	420	269	180
ヒスチジン	0.6%	208	104	70
アルギニン	1.3%	497	185	129

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	349	269	250	180
ロイシン	608	470	440	410	107	115
リジン	611	472	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	306	236	220	160	107	148
フェニルアラニン・チロシン計	626	483	380	390	127	124
スレオニン	345	266	250	210	107	127
トリプトファン	105	81	60	70	135	116
バリン	420	325	310	220	105	148
ヒスチジン	208	160	-	120	-	134
全窒素量(g)	1.3					

