アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	366	202	136	132
ロイシン	1.7%	608	370	243	211
リジン	1.7%	626	185	125	226
メチオニン	0.5%	185	185	118	
シスチン	0.3%	112			
メチオニン・シスチン計	0.8%	295	353	233	154
フェニルアラニン	1.0%	347	252	161	
チロシン	0.7%	260			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	607	404	265	261
スレオニン	1.0%	353	235	154	172
トリプトファン	0.3%	105	77	50	57
バリン	1.2%	424	269	175	140
ヒスチジン	0.9%	322	104	68	64
アルギニン	1.4%	505	185	125	183

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	366	282	250	180
ロイシン	608	469	440	410	107	114
リジン	626	483	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	295	227	220	160	103	142
フェニルアラニン・チロシン計	607	468	380	390	123	120
スレオニン	353	272	250	210	109	130
トリプトファン	105	81	60	70	135	116
バリン	424	327	310	220	105	149
ヒスチジン	322	248	-	120	-	206
全窒素量(g)	1.3