



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.3%	528	202	150	146
ロイシン	2.2%	880	370	268	232
リジン	2.3%	920	185	138	248
メチオニン	0.7%	270	185	130	
シスチン	0.4%	152			
メチオニン・シスチン計	1.1%	419	353	256	169
フェニルアラニン	1.2%	490	252	177	
チロシン	1.0%	380			
フェニルアラニン・チロシン計	2.2%	870	404	292	288
スレオニン	1.3%	502	235	169	189
トリプトファン	0.4%	146	77	55	63
バリン	1.5%	592	269	193	154
ヒスチジン	1.2%	482	104	75	71
アルギニン	1.8%	714	185	138	201

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	528	291	250	180
ロイシン	880	485	440	410	110	118
リジン	920	507	340	360	149	141
メチオニン・シスチン計	419	231	220	160	105	144
フェニルアラニン・チロシン計	870	480	380	390	126	123
スレオニン	502	276	250	210	111	132
トリプトファン	146	80	60	70	134	115
バリン	592	326	310	220	105	148
ヒスチジン	482	266	-	120	-	221
全窒素量(g)	1.8					

