

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	330	202	139	135
ロイシン	1.5%	562	370	249	216
リジン	1.6%	583	185	128	231
メチオニン	0.5%	184	185	121	
シスチン	0.3%	103			
メチオニン・シスチン計	0.8%	287	353	238	157
フェニルアラニン	0.9%	322	252	165	
チロシン	0.7%	243			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	565	404	271	267
スレオニン	0.9%	327	235	157	176
トリプトファン	0.3%	92	77	51	59
バリン	1.1%	396	269	179	143
ヒスチジン	0.5%	200	104	70	66
アルギニン	1.2%	457	185	128	187

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	330	279	250	180	112	155
ロイシン	562	476	440	410	108	116
リジン	583	493	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	287	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	565	478	380	390	126	123
スレオニン	327	277	250	210	111	132
トリプトファン	92	78	60	70	130	112
バリン	396	335	310	220	108	152
ヒスチジン	200	169	-	120	-	141
全窒素量(g)	1.2					

