

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	384	202	134	130
ロイシン	1.8%	643	370	239	208
リジン	1.8%	649	185	123	222
メチオニン	0.6%	195	185	116	
シスチン	0.3%	118			
メチオニン・シスチン計	0.9%	310	353	229	151
フェニルアラニン	1.1%	370	252	158	
チロシン	0.8%	283			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	653	404	260	257
スレオニン	1.0%	368	235	151	169
トリプトファン	0.3%	109	77	49	56
バリン	1.2%	433	269	172	137
ヒスチジン	1.0%	339	104	67	63
アルギニン	1.5%	538	185	123	179

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	384	290	250	180
ロイシン	643	486	440	410	110	118
リジン	649	490	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	310	234	220	160	107	146
フェニルアラニン・チロシン計	653	493	380	390	130	126
スレオニン	368	278	250	210	111	132
トリプトファン	109	82	60	70	137	117
バリン	433	327	310	220	105	149
ヒスチジン	339	256	-	120	-	213
全窒素量(g)	1.3					

