

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	366	217	148	144
ロイシン	1.6%	604	397	265	230
リジン	1.6%	628	199	136	245
メチオニン	0.5%	213	199	128	
シスチン	0.3%	113			
メチオニン・シスチン計	0.8%	328	379	253	167
フェニルアラニン	0.9%	356	271	175	
チロシン	0.7%	274			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	630	434	288	284
スレオニン	0.9%	353	253	167	187
トリプトファン	0.3%	106	83	55	62
バリン	1.1%	431	289	191	152
ヒスチジン	1.2%	450	112	74	70
アルギニン	1.3%	488	199	136	199

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	366	279	250	180
ロイシン	604	461	440	410	105	112
リジン	628	479	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	328	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	630	481	380	390	126	123
スレオニン	353	270	250	210	108	128
トリプトファン	106	81	60	70	135	116
バリン	431	329	310	220	106	150
ヒスチジン	450	344	-	120	-	286
全窒素量(g)	1.3					

