



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	335	217	133	130
ロイシン	1.6%	572	397	238	207
リジン	1.7%	592	199	123	221
メチオニン	0.5%	186	199	116	
シスチン	0.3%	106			
メチオニン・シスチン計	0.8%	291	379	228	151
フェニルアラニン	0.9%	329	271	158	
チロシン	0.7%	249			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	578	434	259	256
スレオニン	0.9%	331	253	151	168
トリプトファン	0.3%	94	83	49	56
バリン	1.1%	401	289	172	137
ヒスチジン	0.6%	204	112	67	63
アルギニン	1.3%	468	199	123	179

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	335	280	250	180
ロイシン	572	477	440	410	108	116
リジン	592	494	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	291	242	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	578	482	380	390	127	124
スレオニン	331	276	250	210	111	132
トリプトファン	94	78	60	70	131	112
バリン	401	335	310	220	108	152
ヒスチジン	204	170	-	120	-	142
全窒素量(g)	1.2					

