

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	348	217	138	134
ロイシン	1.6%	581	397	247	214
リジン	1.7%	608	199	127	228
メチオニン	0.5%	191	199	120	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.8%	301	379	236	156
フェニルアラニン	1.0%	346	271	163	
チロシン	0.7%	261			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	607	434	268	265
スレオニン	0.9%	341	253	156	174
トリプトファン	0.3%	99	83	51	58
バリン	1.1%	408	289	178	141
ヒスチジン	0.7%	239	112	69	65
アルギニン	1.4%	492	199	127	185

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	348	282	250	180
ロイシン	581	470	440	410	107	115
リジン	608	491	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	301	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	607	491	380	390	129	126
スレオニン	341	276	250	210	110	131
トリプトファン	99	80	60	70	133	114
バリン	408	330	310	220	106	150
ヒスチジン	239	193	-	120	-	161
全窒素量(g)	1.2					

