



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	360	217	134	131
ロイシン	1.7%	604	397	240	208
リジン	1.7%	597	199	124	222
メチオニン	0.5%	185	199	116	
シスチン	0.3%	117			
メチオニン・シスチン計	0.8%	300	379	229	152
フェニルアラニン	1.0%	354	271	159	
チロシン	0.8%	267			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	621	434	261	258
スレオニン	1.0%	348	253	152	169
トリプトファン	0.3%	105	83	49	56
バリン	1.2%	412	289	173	138
ヒスチジン	0.9%	314	112	67	64
アルギニン	1.5%	530	199	124	180

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	360	283	250	180
ロイシン	604	475	440	410	108	116
リジン	597	470	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	300	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	621	488	380	390	128	125
スレオニン	348	273	250	210	109	130
トリプトファン	105	83	60	70	138	118
バリン	412	324	310	220	105	147
ヒスチジン	314	247	-	120	-	206
全窒素量(g)	1.3					

