

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	415	217	145	141
ロイシン	1.9%	710	397	259	225
リジン	1.9%	717	199	133	240
メチオニン	0.6%	233	199	126	
シスチン	0.3%	131			
メチオニン・シスチン計	1.0%	365	379	247	164
フェニルアラニン	1.1%	422	271	171	
チロシン	0.8%	322			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	744	434	282	278
スレオニン	1.1%	409	253	164	183
トリプトファン	0.3%	120	83	53	61
バリン	1.3%	483	289	187	148
ヒスチジン	0.9%	326	112	72	69
アルギニン	1.6%	596	199	133	194

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	415	274	250	180
ロイシン	710	469	440	410	107	114
リジン	717	474	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	365	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	744	492	380	390	129	126
スレオニン	409	271	250	210	108	129
トリプトファン	120	79	60	70	132	113
バリン	483	320	310	220	103	145
ヒスチジン	326	216	-	120	-	180
全窒素量(g)	1.5					

