

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	371	217	136	132
ロイシン	1.7%	622	397	243	211
リジン	1.7%	623	199	125	225
メチオニン	0.5%	187	199	118	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	0.8%	301	379	232	154
フェニルアラニン	1.0%	361	271	161	
チロシン	0.8%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	636	434	264	261
スレオニン	1.0%	356	253	154	171
トリプトファン	0.3%	107	83	50	57
バリン	1.2%	421	289	175	139
ヒスチジン	0.9%	324	112	68	64
アルギニン	1.5%	521	199	125	182

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	371	287	250	180	115	160
ロイシン	622	481	440	410	109	117
リジン	623	482	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	301	233	220	160	106	145
フェニルアラニン・チロシン計	636	492	380	390	129	126
スレオニン	356	275	250	210	110	131
トリプトファン	107	83	60	70	138	118
バリン	421	326	310	220	105	148
ヒスチジン	324	251	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.3					

