

サプリメントは、
分数の入力

ラム数ではなく、個数または杯数です。
方法 例: $2/3 \rightarrow$ ゼロ+スペース+ $2/3$

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	419	217	148	144
ロイシン	1.8%	706	397	265	230
リジン	1.8%	712	199	136	246
メチオニン	0.6%	237	199	129	
シスチン	0.3%	135			
メチオニン・シスチン計	1.0%	375	379	253	168
フェニルアラニン	1.1%	428	271	175	
チロシン	0.8%	324			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	751	434	288	285
スレオニン	1.1%	420	253	168	187
トリプトファン	0.3%	124	83	55	62
バリン	1.3%	507	289	191	152
ヒスチジン	1.0%	382	112	74	70
アルギニン	1.5%	603	199	136	199

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	419	267	250	180	107	148
ロイシン	706	450	440	410	102	110
リジン	712	454	340	360	134	126
メチオニン・シスチン計	375	239	220	160	109	149
フェニルアラニン・チロシン計	751	479	380	390	126	123
スレオニン	420	268	250	210	107	128
トリプトファン	124	79	60	70	132	113
バリン	507	323	310	220	104	147
ヒスチジン	382	243	-	120	-	203
全窒素量(g)	1.6					

