

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	352	217	131	127
ロイシン	1.7%	591	397	234	203
リジン	1.7%	591	199	120	217
メチオニン	0.5%	178	199	113	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.8%	286	379	223	148
フェニルアラニン	1.0%	343	271	155	
チロシン	0.8%	260			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	604	434	254	251
スレオニン	1.0%	339	253	148	165
トリプトファン	0.3%	102	83	48	55
バリン	1.2%	401	289	168	134
ヒスチジン	0.9%	307	112	65	62
アルギニン	1.4%	497	199	120	175

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	352	287	250	180	115	159
ロイシン	591	481	440	410	109	117
リジン	591	481	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	286	233	220	160	106	146
フェニルアラニン・チロシン計	604	492	380	390	129	126
スレオニン	339	276	250	210	110	132
トリプトファン	102	83	60	70	138	118
バリン	401	327	310	220	105	148
ヒスチジン	307	250	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.2					

