

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	408	217	143	140
ロイシン	1.9%	698	397	256	223
リジン	1.9%	719	199	132	238
メチオニン	0.6%	227	199	124	
シスチン	0.3%	128			
メチオニン・シスチン計	0.9%	357	379	245	162
フェニルアラニン	1.1%	413	271	170	
チロシン	0.8%	317			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	730	434	279	275
スレオニン	1.1%	405	253	162	181
トリプトファン	0.3%	118	83	53	60
バリン	1.3%	479	289	185	147
ヒスチジン	0.9%	323	112	72	68
アルギニン	1.5%	566	199	132	192

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	408	272	250	180
ロイシン	698	465	440	410	106	113
リジン	719	479	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	357	238	220	160	108	149
フェニルアラニン・チロシン計	730	487	380	390	128	125
スレオニン	405	270	250	210	108	129
トリプトファン	118	78	60	70	131	112
バリン	479	319	310	220	103	145
ヒスチジン	323	215	-	120	-	179
全窒素量(g)	1.5					

