



アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	360	217	139	135
ロイシン	1.6%	600	397	248	215
リジン	1.7%	631	199	128	230
メチオニン	0.5%	198	199	120	
シスチン	0.3%	112			
メチオニン・シスチン計	0.9%	310	379	237	157
フェニルアラニン	1.0%	355	271	164	
チロシン	0.7%	270			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	625	434	270	267
スレオニン	1.0%	352	253	157	175
トリプトファン	0.3%	101	83	51	58
バリン	1.2%	421	289	179	142
ヒスチジン	0.7%	247	112	69	66
アルギニン	1.4%	507	199	128	186

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	360	283	250	180
ロイシン	600	472	440	410	107	115
リジン	631	495	340	360	146	138
メチオニン・シスチン計	310	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	625	491	380	390	129	126
スレオニン	352	277	250	210	111	132
トリプトファン	101	79	60	70	132	114
バリン	421	331	310	220	107	150
ヒスチジン	247	194	-	120	-	162
全窒素量(g)	1.3					

