

サプリメント

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
	/DM	mg			乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	387	217	148	144
ロイシン	1.6%	634	397	265	230
リジン	1.7%	662	199	136	245
メチオニン	0.6%	221	199	128	
シスチン	0.3%	118			
メチオニン・シスチン計	0.9%	341	379	253	167
フェニルアラニン	1.0%	376	271	175	
チロシン	0.7%	287			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	663	434	288	284
スレオニン	1.0%	371	253	167	187
トリプトファン	0.3%	111	83	54	62
バリン	1.2%	451	289	191	152
ヒスチジン	1.2%	475	112	74	70
アルギニン	1.3%	513	199	136	198

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	387	280	250	180	112	155
ロイシン	634	459	440	410	104	112
リジン	662	479	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	341	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	663	479	380	390	126	123
スレオニン	371	268	250	210	107	128
トリプトファン	111	80	60	70	134	115
バリン	451	326	310	220	105	148
ヒスチジン	475	344	-	120	-	286
全窒素量(g)	1.4					

