



アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	379	217	144
ロイシン	1.7%	646	397	258
リジン	1.7%	655	199	133
メチオニン	0.6%	234	199	125
シスチン	0.3%	127		
メチオニン・シスチン計	1.0%	364	379	246
フェニルアラニン	1.0%	386	271	171
チロシン	0.8%	301		
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	687	434	280
スレオニン	1.0%	392	253	163
トリプトファン	0.3%	115	83	53
バリン	1.2%	468	289	186
ヒスチジン	1.0%	362	112	72
アルギニン	1.5%	574	199	133

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	379	263	250	180
ロイシン	646	448	440	410	102	109
リジン	655	454	340	360	134	126
メチオニン・シスチン計	364	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	687	476	380	390	125	122
スレオニン	392	272	250	210	109	130
トリプトファン	115	80	60	70	133	114
バリン	468	325	310	220	105	148
ヒスチジン	362	251	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.4					

